



Deutsche Gesellschaft
für Implantologie

Presse-Information · 21. September 2023

S3-Leitlinie Implantologische 3D-Röntgen- diagnostik und navigationsgestützte Implantologie

Deutsche Gesellschaft für Implantologie im Zahn-, Mund- und Kiefer-
bereich (DGI) legt Leitlinie vor

Vor einer Implantation ist eine radiologische Untersuchung der umgebenden Knochen-
gewebe erforderlich. In fünf Empfehlungen haben Fachleute von 17 Fach-gesellschaften
und Organisationen unter Federführung der DGI und der DGZMK in einer S3-Leitlinie
formuliert, wann eine 3D-Diagnostik empfohlen wird und was dabei beachtet werden sollte.
Hinzu kommt eine weitere Empfehlung zur navigationsgestützten Implantattherapie.

Röntgendiagnostik wichtig. Jede Röntgenaufnahme erfordert eine „rechtfertigende
Indikation“, die von Ärzten oder Zahnärzten mit der dafür erforderlichen Fachkunde gestellt
werden muss. Eine solche ist stets vor einer Implantatinsertion erforderlich, um Menge und
Qualität des Knochengewebes sowie die angrenzenden anatomischen Strukturen beurteilen zu
können. „In vielen Fällen ist hierzu eine zweidimensionale Röntgendiagnostik mit Referenz-
körpern indiziert und ausreichend“, schreiben die Fachleute im Begleittext der neuen S3-
Leitlinie zum Thema.

Sieben Indikationen für 3D. Die Autorinnen und Autoren haben insgesamt sieben
Indikationen aufgelistet, bei denen eine 3D-Röntgendiagnostik hilfreich sein kann. Beispiele
dafür sind etwa deutliche anatomische Abweichungen, pathologische Veränderungen oder
eine unsichere Darstellung von Nachbarstrukturen. Auch spezielle Therapiekonzepte kön-
nen eine Untersuchung mit der Digitalen Volumetomographie (DVT) nötig machen, die in
der Zahnmedizin überwiegend eingesetzt wird.

In der ersten Empfehlung der Leitlinie formulieren die Fachleute die Notwendigkeit einer
ausreichenden radiologischen Diagnostik des Implantatbettes vor einer Implantatinsertion.
Lassen sich die notwendigen Informationen für Diagnostik, Therapieentscheidung und die
Durchführung der Behandlung mit einer zweidimensionalen Untersuchung nicht gewinnen,
sollte die 3D-Diagnostik erfolgen. Wird eine Therapie computergestützt geplant
(Empfehlung drei), sollte in der Regel eine DVT erfolgen.

Starke Empfehlung zum Thema Strahlenbelastung. In Leitlinien der höchsten Stufe (S3)
können die Empfehlungen unterschiedliche Empfehlungsgrade haben, abhängig etwa von
einer Nutzen-Schaden-Abwägung und der wissenschaftlichen Evidenz. Eine starke

Wichtiges auf einen Blick

Strahlenexposition: Das Akronym ALADA (as low as diagnostically acceptable) legt den Fokus auf
die Art und die Einstellung des Röntgengerätes. Der Informationsgehalt von „low dose“ Protokollen in
der implantologischen Diagnostik ist überwiegend nicht nachteiliger als strahlenintensivere
Einstellungen.

Genauigkeit des DVT: Die Messungenauigkeit im DVT liegt teilweise über 1 mm. Da es zu einer
Akkumulation von Ungenauigkeiten im Implantationsprozess kommt, sollte eine Sicherheitsabstand
von 2 mm von wichtigen Strukturen wie dem Nervus alveolaris inferior eingehalten werden.

DVT und periimplantäres Gewebe: Eine Beurteilung des periimplantären Gewebes ist möglich,
jedoch im unmittelbaren Nahbereich eingeschränkt. Zur Beurteilung des Knochens sollte zunächst ein
zweidimensionales Verfahren eingesetzt werden.

Genauigkeit der Navigationsverfahren: Randomisierte kontrollierte Studien zeigen eine hohe und
vergleichbare Präzision der statischen- und dynamischen Navigations-verfahren. Freihand implantierte
Implantate zeigen eine verringerte Genauigkeit.

Implantatüberleben: Das Navigationsverfahren hat keinen Einfluss auf das Implantat-überleben nach
einem, drei und fünf Jahren.

Deutsche Gesellschaft für Implantologie
im Zahn-, Mund- und Kieferbereich e.V.
www.dgi-ev.de

Pressestelle

Dipl. Biol. Barbara Ritzert
ProScience Communications GmbH
Andechser Weg 17 · 82343 Pöcking
Fon: 08157 9397-0
presse@dgi-ev.de

Pressesprecherin

Dr. Dr. Anette Strunz
Praxis für Implantologie und Mund-,
Kiefer-, Gesichtschirurgie
Bundesallee 56 · 10715 Berlin
Fon (Praxis): 030 85 75 75 85
strunz@dgi-ev.de



Der Koordinator der Leitlinie Prof.
Dr. Dr. Jörg Wiltfang (Kiel)



Der federführende Autor der
Leitlinie Dr. Dr. Burkhard
Kunzendorf (Kiel)

Der Vorstand
des DGI e.V.

Präsident: Prof. Dr. Florian Beuer MME, Berlin
Vizepräsident: Dr. Christian Hammächer, Aachen
Schriftführer: Prof. Dr. Stefan Wolfart, Aachen
Schatzmeister: PD Dr. Dr. Eik Schiegnitz

Fortbildungsreferent: Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas, Mainz
Pressesprecherin: Dr. Dr. Anette Strunz, Berlin
Pastpräsident: Prof. Dr. Dr. Knut A. Grötz, Wiesbaden
VR-Nr.: 10918 | Amtsgericht München | 05.01.1984

Empfehlung haben die Fachleute zum Thema Strahlenbelastung formuliert: „Für die dreidimensionale Röntgenbildgebung soll das der Indikation entsprechende Verfahren mit der geringsten Strahlenbelastung gewählt werden. Bei der Einstellung des DVT soll das, entsprechend der Fragestellung, kleinstmögliche Field of View (FoV) (Aufnahmevolumen) verwendet und eine adäquate Ortsauflösung gewählt werden, die zu einer möglichst geringen Strahlenexposition führen.“

Genauigkeit und Grenzen der DVT. Zwei Empfehlungen gibt es zu den Grenzen der DVT. Die Diagnostik der periimplantären Umgebung im DVT ist zwar möglich, erklären die Fachleute, im unmittelbaren Nahbereich sei diese jedoch nur eingeschränkt beurteilbar. Daher empfehlen die Autoren die Kontrolle des periimplantären Knochens zunächst durch eine zweidimensionale Bildgebung.

In Empfehlung Nr. 5 geht es um die Beachtung möglicher Messungenauigkeiten der DVT bei der Implantatinsertion. Zu wichtigen anatomischen Strukturen, wie z.B. dem Nervus alveolaris inferior und dem Foramen mentale sollte stets ein Sicherheitsabstand von zwei Millimeter eingehalten werden.

Navigation in der Implantologie. Die Implantatinsertion lässt sich mit speziellen Computerprogrammen auf Basis dreidimensionaler Bilddaten präoperativ virtuell planen. Solche Konzepte kommen in der Zahnmedizin – insbesondere in der Implantologie – zunehmend zum Einsatz. Aus Implantatdatenbanken können beispielsweise Implantate verschiedener Hersteller ausgewählt und virtuell am Computer positioniert werden. Neue Software-Tools mit optimierten Ansichten des Implantatlagers verbessern die virtuelle Planung der Behandlung zusätzlich. Dafür werden Daten von Laser-Scannern mit Hilfe von Referenzmarkern mit den Daten der 3D-DVT übereinandergelegt. So erfolgt auch die Zahnaufstellung virtuell.

Umgesetzt werden kann diese Planung mittels direkter Instrumentennavigation oder mit Hilfe von Bohrschablonen. Studien zeigen, dass Implantate bei einer navigationsgestützten Implantation exakter positioniert werden als bei der „Freihand“-Positionierung. Dies hat jedoch keinen Effekt auf das Überleben der Implantate. Lediglich der postoperative Schmerz ist geringer.

Indikationen für die Navigation. Laut der Empfehlung der Fachleute kann die navigationsgestützte Implantologie eingesetzt werden bei:

- minimalinvasiven Techniken der Implantatinsertion vor allem bei Patienten mit besonderen Risiken (z.B. erhöhte Blutungsneigung)
- bei Zuständen nach komplexer Kieferrekonstruktion
- bei der Umsetzung einer schwierigen prothetischen Zielsetzung und
- bei besonderen Konzepten (z.B. bei der Sofortversorgung mit präfabriziertem Zahnersatz)

Warnungen. Die Autoren der Leitlinie sprechen aber auch deutliche Warnungen aus. Diesen zufolge ist die Anwendung der navigationsgestützten Implantologie an Erfahrungen sowohl im Bereich der 3D-Diagnostik als auch der Anwendung von navigationsgestützten Verfahren gebunden. „Fehler und Ungenauigkeiten“, so die Experten, „sind an jeder Stelle in der Prozesskette möglich. Diese können zu gravierenden Abweichungen von der angestrebten Implantatposition führen.“ Wer operiert, benötigt spezielle Erfahrungen im Bereich der nicht navigationsgestützten Implantologie. Eine weitere Anforderung ist die Einhaltung chirurgischer Standardprotokolle. Die sichere reproduzierbare Positionierung der Röntgen- und Führungsschablone ist eine Grundvoraussetzung.

Verantwortlichkeiten. „Die Planung der navigationsgestützten Implantologie ist eine zahnärztliche Aufgabe“, betonen die Fachleute, und solle vom Operateur zumindest überprüft werden. Bei diesem liegt auch die Verantwortung für den Gesamtprozess.



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Leitlinienkonferenz der DGI 2021 in Ahrenthal